

INTRODUCTION

Les propriétés des fonctions continues de \mathbb{C} vers \mathbb{C} sont analogues à celles des fonctions continues de \mathbb{R} vers \mathbb{R} . La plupart de ces dernières admettent d'ailleurs une extension simple à des fonctions de \mathbb{C} vers \mathbb{C} .


II.1 Définition d'une fonction complexe

Soient A et B deux ensembles non vides dans \mathbb{C} . Si à chaque valeur $z \in A$, il correspond une ou plusieurs valeurs $w \in B$, on dit que w est une fonction de z et on écrit $w = f(z)$ ou

$$f : A \longrightarrow B$$

$$z \longmapsto w = f(z).$$

La fonction $w = f(z)$ définit une correspondance entre deux plans complexes.



Exemple.

$z \mapsto w = f(z) = z^2$. Par exemple, la valeur de f en $z = 2i$ est $f(2i) = (2i)^2 = -4$.

II.2 Fonctions Uniformes et Multiformes

- Si une seule valeur de w correspond à chaque valeur de z on dira que w est une fonction **uniforme** de z ou que $f(z)$ est uniforme.
- Si plusieurs valeurs de w correspondent à chaque valeur de z , on dira que w est une fonction **multiforme** de z .
- Une fonction multiforme peut être considérée comme un ensemble de fonctions uniformes, chaque élément de cet ensemble étant appelé une **branche** de la fonction.
- On choisit habituellement un élément comme **branche principale**, ainsi est appelée **détermination principale**.

Exemples

Si $w = f(z) = z^2$, à toute valeur de z il correspond une seule valeur de w . Donc $f(z) = z^2$ est une fonction uniforme de z . ■

Si l'on considère la fonction $w = f(z) = z^{\frac{1}{2}}$, à chaque valeur de z correspondent deux valeurs de w . Donc $f(z) = z^{\frac{1}{2}}$ est une fonction multiforme de z . ■

II.3 Opérations sur les Fonctions Complexes**II.3.1 La fonction inverse**

Si $w = f(z)$, on peut aussi considérer z comme fonction de w , ce qui peut s'écrire sous la forme $z = g(w) = f^{-1}(w)$. La fonction f^{-1} est appelée la fonction inverse de f .

Exemple

La fonction $g(z) = z^{\frac{1}{2}}$ est la fonction inverse de la fonction $f(z) = z^2$.

II.3.2 Décomposition

Si $z = x + iy$, on peut écrire $f(z)$ comme $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$. Les fonctions u et v sont appelées, respectivement, **partie réelle** et **partie imaginaire** de f . On note

$$u = \operatorname{Re}(f) \quad \text{et} \quad v = \operatorname{Im}(f).$$

Exemple

$$f(z) = z^3 = (x + iy)^3 = (x^3 - 3xy^2) + (3yx^2 - y^3)i.$$

Les parties réelle et imaginaire sont $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$ et $v(x, y) = 3yx^2 - y^3$.

II.3.3 Limites

Soit f une fonction complexe à une variable complexe, on dit que f admet une limite l en $z_0 = x_0 + iy_0$, et on note $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$, si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } 0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - l| < \varepsilon.$$

Exemple

Soit $f(z) = z^2$. Par exemple $\lim_{z \rightarrow i} f(z) = f(i) = i^2 = -1$.

Posons $l = a + ib$ et $f = u + iv$ où a, b, u et v sont des réels, alors

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \iff \left\{ \begin{array}{l} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = a \text{ et } \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = b \end{array} \right\}.$$

Quand la limite d'une fonction existe, elle est unique. Si la fonction f est multiforme la limite de f quand $z \rightarrow z_0$ peut dépendre de la branche choisie.

II.3.4 Continuité

Soit f une fonction complexe uniforme. La fonction f est dite continue en z_0 si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z)$.

Une fonction f est dite continue dans une région du plan complexe si elle est continue en tous les points de cette région.

Exemple

Soit f la fonction définie par

$$f(z) = \begin{cases} z^2 & \text{si } z \neq i \\ 0 & \text{si } z = i. \end{cases}$$

Quand z tend vers i , $f(z)$ se rapproche de $i^2 = -1$, i.e. $\lim_{z \rightarrow i} f(z) = i^2 = -1$. Mais $f(i) = 0$.

Donc $\lim_{z \rightarrow i} f(z) \neq f(i)$ et la fonction n'est pas continue en $z = i$. ■

La fonction $f = u + iv$ est continue dans un domaine si et seulement si la partie réelle u et la partie imaginaire v sont continues.

II.4 Fonctions Elémentaires

II.4.1 Fonctions Polynômales

Les fonctions polynômales sont définies par

$$f(z) = P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0,$$

où $a_n \neq 0$, a_0, a_1, \dots, a_n sont des constantes complexes et n un entier positif appelé le **degré** du polynôme $P(z)$.

II.4.2 Fractions rationnelles

Les fractions rationnelles sont définies par

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

où P et Q sont des polynômes. Le cas particulier $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, où $ad - bc \neq 0$ est appelé transformation **homographique**.

II.4.3 Fonctions Exponentielles

Les fonctions exponentielles sont définies par

$$f(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

formule dans laquelle e est la base des logarithmes népériens, $e \approx 2,718$. Si a est réel et positif on définit

$$a^z = e^{z \operatorname{Log} a}.$$

Les fonctions exponentielles complexes ont des propriétés analogues à celles des fonctions exponentielles réelles. Ainsi par exemple $e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$, $\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$.

II.4.4 Fonctions Trigonométriques

Nous définirons les fonctions trigonométriques ou **circulaires**, $\sin z$, $\cos z$, etc., à l'aide des fonctions exponentielles de la manière suivante.

$$\begin{aligned}\sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} & \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \sec z &= \frac{1}{\cos z} = \frac{2}{e^{iz} + e^{-iz}} & \csc z &= \frac{1}{\sin z} = \frac{2i}{e^{iz} - e^{-iz}} \\ \tg z &= \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} + e^{-iz})} & \cotg z &= \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{i(e^{iz} + e^{-iz})}{e^{iz} - e^{-iz}}.\end{aligned}$$

La plupart des propriétés des fonctions trigonométriques réelles sont encore valables dans le cas complexe. Ainsi par exemple $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$, $\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$,

II.4.5 Fonctions Hyperboliques

Les fonctions hyperboliques sont définies comme suit :

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{sech} z = \frac{1}{\operatorname{ch} z} = \frac{2}{e^z + e^{-z}}$$

$$\operatorname{csch} z = \frac{1}{\operatorname{sh} z} = \frac{2}{e^z - e^{-z}}$$

$$\operatorname{th} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

$$\operatorname{coth} z = \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z} = \frac{e^z + e^{-z}}{e^z - e^{-z}}.$$

Les propriétés suivantes sont encore vérifiées :

$$\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1, \operatorname{sh}(z_1 + z_2) = \operatorname{sh} z_1 \operatorname{ch} z_2 + \operatorname{ch} z_1 \operatorname{sh} z_2, \dots$$

Les fonctions trigonométriques (ou circulaires) et les fonctions hyperboliques sont liées par les relations suivantes :

$$\sin(iz) = i \operatorname{sh} z \quad \cos(iz) = \operatorname{ch} z \quad \operatorname{tg}(iz) = i \operatorname{th} z$$

$$\operatorname{sh}(iz) = i \sin z \quad \operatorname{ch}(iz) = \cos z \quad \operatorname{th}(iz) = i \operatorname{tg} z.$$

II.4.6 Fonctions Logarithmiques

La fonction $f(z) = \operatorname{Log} z, z \neq 0$ est définie comme l'inverse de la fonction exponentielle e^z .

$$w = \operatorname{Log} z \Leftrightarrow z = e^w.$$

La fonction $\operatorname{Log} z, z \neq 0$ est une fonction multiforme définie par

$$\begin{aligned} \operatorname{Log} z &= \ln|z| + i \arg z \\ &= \ln|z| + i(\operatorname{Arg} z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}, \text{ où } -\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi. \end{aligned}$$

La détermination **principale** ou valeur principale de $\operatorname{Log} z$ est souvent définie par

$$\operatorname{Log} z = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z, \text{ où } -\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi.$$

Exemples

$$\operatorname{Log}(-1) = \ln|-1| + i \arg(-1) = i(\pi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pour la détermination principale, $\operatorname{Log}(-1) = i\pi$. ■

Utilisons la détermination principale du logarithme :

$$\text{Log} (1+i) = \ln |1+i| + i \text{Arg} (1+i) = \ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{4}i,$$

$$\text{Log} (-1) = \ln |-1| + i \text{Arg} (-1) = \pi i,$$

$$\text{Log} ((1+i)(-1)) = \text{Log} (-1-i) = \ln |-1-i| + i \text{Arg} (-1-i) = \ln \sqrt{2} - \frac{3\pi}{4}i.$$

On remarque que $\text{Log} ((1+i)(-1)) = \text{Log} (1+i) + \text{Log} (-1) - 2\pi i$. ■

II.4.7 La Fonction z^α

La fonction z^α , $\alpha \in \mathbb{C}$, est définie par

$$z^\alpha = e^{\alpha \text{Log} z}.$$

De même si $f(z)$ et $g(z)$ sont deux fonctions données, de z , on peut définir

$$f(z)^{g(z)} = e^{g(z) \text{Log} f(z)}.$$

En général de telles fonctions sont multiformes.

NB

On a $(z^\alpha)^k = z^{\alpha k}$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{Z}$. Mais $(z^\alpha)^\beta \neq z^{\alpha \beta}$ dans le cas général si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

Exemples

1)

$$i^{-i} = e^{-i \text{Log} i} = e^{-i(\ln|i|+i \arg(i))} = e^{-i^2(\frac{\pi}{2}+2k\pi)} = e^{\frac{\pi}{2}+2k\pi}, k \in \mathbb{Z}.$$

La détermination principale est $i^{-i} = e^{\frac{\pi}{2}}$. ■

2)

$$\begin{aligned} \text{On a } ((-i)^2)^i &= (-1)^i = e^{i \text{Log} (-1)} = e^{i(\ln|-1|+i \arg(-1))} = e^{i^2(\pi+2k\pi)} = e^{-\pi-2k\pi}, k \in \mathbb{Z}. \text{ Mais} \\ (-i)^{2i} &= e^{2i \text{Log} (-i)} = e^{2i(\ln|-i|+i \arg(-i))} = e^{2i^2(-\frac{\pi}{2}+2k\pi)} = e^{\pi-4k\pi}, k \in \mathbb{Z}. \blacksquare \end{aligned}$$

II.4.8 Fonctions trigonométriques inverses

$$\text{Arcsin } z = \frac{1}{i} \text{Log} (iz + \sqrt{1 - z^2})$$

$$\text{Arcos } z = \frac{1}{i} \text{Log} (z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$$\text{Arctg } z = \frac{1}{2i} \text{Log} \left(\frac{1 + iz}{1 - iz} \right)$$

$$\text{Arcotg } z = \frac{1}{2i} \text{Log} \left(\frac{z + i}{z - i} \right).$$

II.4.9 Fonctions Hyperboliques inverses

$$\text{Argsh } z = \text{Log} (z + \sqrt{z^2 + 1})$$

$$\text{Argch } z = \text{Log} (z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$$\text{Argth } z = \frac{1}{2} \text{Log} \left(\frac{1 + z}{1 - z} \right)$$

$$\text{Argcoth } z = \frac{1}{2} \text{Log} \left(\frac{z + 1}{z - 1} \right).$$