

Probabilités & Statistique

Partie B : Probabilités


Dr. Ahlam GUIATNI

Université de Jijel

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département de Génie Civil et Hydraulique

Email : ahlam.guiatni@univ.jijel.dz



Dr. Ahlam GUIATNI

Table des matières

I - Chapitre 3 : Variables aléatoires	3
1. Objectifs	3
2. Prérequis	3
3. Définition et explications.....	3
4. Loi de probabilité d'une VA	5
4.1. Loi de probabilité d'une VAD	5
4.2. Loi de probabilité d'une VAC.....	5
5. Fonction de répartition	6
5.1. Fonction de répartition d'une VAD	6
5.2. Fonction de répartition d'une VAC	6
6. Caractéristiques des variables aléatoires	7
6.1. Espérance mathématique (moyenne)	7
6.2. Variance	7
6.3. L'écart-type	7



Chapitre 3 : Variables aléatoires

1. Objectifs

L'objectif du chapitre 2 est :



- Découvrir les variables aléatoires.
- Apprendre à manipuler les variables aléatoires.
- Déterminez la loi de probabilité d'une Variable Aléatoire Discrète (VAD).
- Définir et calculer dans des cas simples la fonction de distribution d'une variable aléatoire discrète.
- Apprendre à utiliser quelques lois usuelles discrètes.
- Appréhender les Variables Aléatoires Continues (VAC).
- Définir la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue.
- Familiariser avec quelques lois usuelles continues.
- Calculer l'espérance, variance et l'écart type.

2. Prérequis

Il est recommandé aux apprenants de connaître :

- Les calculs d'intégrales.
- Fonctions : limites et continuité.

3. Définition et explications

Introduction

Une variable aléatoire VA est une fonction définie sur l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire, telle qu'il soit possible de déterminer la probabilité pour qu'elle prenne une valeur donnée ou qu'elle prenne une valeur dans un intervalle donné. À l'origine, une variable était une fonction de gain, qui représentait le gain obtenu à l'issue du résultat d'un jeu. Par exemple, lorsqu'on lance deux dés, on s'intéresse à la somme des chiffres égale à 7. les couples (1,6), (6,1), (5,2), (2,5), (3,4), (4,3) font que la somme est égale à 7. Comme cette somme dépend des valeurs aléatoires, il s'agit d'une variable aléatoire.



Soit (Ω, \mathcal{S}, P) un espace de probabilités, une variable aléatoire X sur un ensemble fondamental Ω est une fonction de Ω sur \mathbb{R}

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ $\omega \mapsto X(\omega)$

telle que l'image inverse de chaque intervalle de \mathbb{R} par X soit un événement de S .

$$I = [a, b] \subset \mathbb{R}$$

$$X^{-1}([a, b]) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) \in [a, b]\}$$

X est appelée **variable aléatoire réelle**.

Exemple

Donnons un exemple simple du lancer de deux dés, ce qui est équivalent à lancer deux fois un dé. Une première variable aléatoire X_1 donne le résultat du premier lancer, une deuxième X_2 donne le résultat du deuxième lancer, c'est-à-dire $X_1(\omega) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $X_2(\omega) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ que l'on note plus simplement $X_1 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $X_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Il est possible de s'intéresser à la somme des deux résultats, qui peut être notée par une variable aléatoire $S \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.

Les types de VA

Nous allons distinguer deux groupes de variables aléatoires : Les VA quantitatives et les VA qualitatives.

1. Variables aléatoires quantitatives :

Ici, nous retrouverons toutes les VA numériques. On distingue deux types de variables quantitatives :

- o Les variables discrètes VAD: Les valeurs sont discrètes, ce sont des nombres entiers (fini ou infini dénombrable).

$$X \in D_x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \text{ (VAD finie)}$$

$$X \in D_x = \{x_1, x_2, \dots\} \text{ (VAD infinie)}$$

- o Les variables continues VAC: Toutes les valeurs comprises dans un intervalle défini sont possibles. $X \in [a, b] \subset \mathbb{R}$

2. Variable qualitatives :

- o Les variables nominales ou lexicales : Les différentes modalités de la variable ne peuvent être ordonnées.
- o Les variables ordinaires : Les modalités de la variable possèdent la propriété d'ordre.

Probabilités d'une VA

Soit X une VA définie par une application : $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ pouvant prendre les valeurs dans $D_x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

Par définition la probabilité pour que $X = x$ est la probabilité des éléments de Ω ayant pour image la valeur x dans l'application. $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$; $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$,

avec $p_i = P(X = x_i) : i = \overline{1, n}$,

on a $p_i = P(X = x_i) = P(\{\omega \in \Omega / X(\omega) = x_i\})$.

4. Loi de probabilité d'une VA

4.1. Loi de probabilité d'une VAD

Soit x une VAD (finie). On appelle loi de probabilité de x la donnée :

- De l'ensemble des valeurs possibles : $D_x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.
- De la probabilité de chaque valeur : $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} / p_i = P(X=x_i)$.

On désignera par f la loi de probabilité de x , ce qui s'écrit : $\forall i, f(x_i) = P(X=x_i)$.

La fonction f s'appelle fonction de distribution de la VAD x .



Remarque

1. $\forall i: f(x_i) = P(X=x_i) \geq 0$
2. $\sum_{i=1}^{n(\infty)} f(x_i) = \sum_{i=1}^{n(\infty)} P(X=x_i) = 1$
3. $P(a \leq x \leq b) = \sum_{x_i \in [a, b]} f(x_i)$



Exemple

Soit x la VA donnée par le tableau suivant :

x_i	$f(x_i)$
0	1/8
1	3/8
2	3/8
3	1/8

$$P(0 \leq x \leq 2) = \sum_{x_i \in [0, 2]} f(x_i) = f(0) + f(1) + f(2) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}.$$

4.2. Loi de probabilité d'une VAC

Soit x une VAC. On appelle loi de probabilité de x ou densité de probabilité la fonction f telle que :

- $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$




Remarque

Soit X VAC de densité f :

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

c'est à dire l'aire sous la courbe de f entre a et b .


? **Exemple**

Soit f une fonction densité d'une VAC x définie par :
$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{Si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{Si non} \end{cases}$$

1. Déterminer la valeur de k pour que f soit une densité.
2. Calculer $P\left(\frac{1}{2} \leq x \leq 1\right)$.

5. Fonction de répartition

5.1. Fonction de répartition d'une VAD

? **Définition**

Soit x une VAD (finie ou infinie), On appelle fonction de répartition de x définie sur (Ω, \mathcal{S}, P) la fonction F_x définie sur \mathbb{R} par :

$$F_x: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

$$x \mapsto F_x(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$$

5.2. Fonction de répartition d'une VAC

? **Définition**

Soit x une VAC de densité f , On appelle fonction de répartition de x la fonction F_x définie par :

$$F_x(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

+ **Complément**

- Le graphe de F_x est une fonction continue.
- $P(a \leq x \leq b) = F_x(b) - F_x(a)$ (cas où F_x est continue)



Si F_x est continue sur \mathbb{R} et si f est continue, $\forall x \in \mathbb{R}$, alors F_x est dérivable et on a: $F'_x(x) = f(x)$.

6. Caractéristiques des variables aléatoires

6.1. Espérance mathématique (moyenne)

Soit x une VA de fonction de distribution f , l'ensemble mathématique de x que l'on note par $E(x)$ est définie par :

- Pour VAD: $E(x) = \sum_{i=1}^{n(\infty)} x_i f(x_i) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \dots + x_n f(x_n)$.
- Pour VAC: $E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$.

6.2. Variance

$$Var(x) = E(x^2) - (E(x))^2$$

- Pour VAD: $E(x^2) = \sum_{i=1}^{n(\infty)} x_i^2 f(x_i)$.
- Pour VAC: $E(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$.

6.3. L'écart-type

$$\sigma(x) = \sqrt{Var(x)}$$